

表 クビアカツヤカミキリの防除薬剤(抜粋)

作物名	薬剤名 (IRACコード)	適用 害虫名	希釈倍数 (使用液量)	使用方法	使用時期	本剤の 使用回数
うめ、 もも	ロビンフッド(3A)	カミキリ ムシ類	—	樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射	収穫前日まで	5回以内
	ベニカカミキリムシ エアゾール(3A)					
うめ	アクタラ顆粒水溶剤 (4A)	クビア カツヤ カミキリ	2000倍	散布	収穫7日 前まで	2回以内
もも					収穫前日 まで	3回以内
おうとう					収穫7日 前まで	2回以内
小粒核 果類(う めを除く)						
うめ	バイオセーフ (微生物農薬)	カミキリ ムシ類	2500 万頭 (約10g)	25ℓの水に希釈し、木屑排 出孔を中心に薬液が滴るま で樹幹注入	幼虫発生 期	—
もも						
うめ	アクセルフロアブル (22B)		1000倍	散布	収穫前日 まで	3回以内
果樹類 (注)	ロビンフッド(3A)	カミキリ ムシ類	—	樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射		5回以内
	ベニカカミキリムシ エアゾール(3A)					
果樹類	バイオリサ・カミキリ (微生物農薬)	カミキリ ムシ類	1本 /樹	地際に近い主幹の分枝部分 等に架ける	成虫発生 初期	—
樹木類	ロビンフッド(3A)	カミキリ ムシ類	—	樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射	—	6回以内
	ベニカカミキリムシ エアゾール(3A)					
さくら	園芸用 キンチョール E(3A)	クビア カツヤ カミキリ	—	食入部にノズルを差し込み、薬 剤が食入部から流出するまで噴 射する。	—	—
	アクセルフロアブル (22B)		1000倍	散布	成虫発生 直前～成 虫発生期	6回以内
	マツグリーン液剤2 (4A)		100倍	木屑排出孔を中心に薬液が 滴るまで樹幹注入	—	6回以内
	バイオリサ・カミキリ (微生物農薬)		50倍	食入孔に注入	発生 初期	5回以内
			1本 /樹	主幹又は主幹の分枝部分に 巻き付ける	成虫発生 初期	—

注) かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、いちよう(種子)、くり、ペカン、
アーモンド、くるみ、食用つばき(種子)を除く